



FROGGYMOUTH

DEGLUTIȚIA SAU ÎNGHIȚIREA

CÂND PRIMIȚI
PACHETUL
FROGGY MOUTH, ÎN
INTERIOR VEȚI GĂSI
INSTRUCȚIUNI CARE
EXPLICĂ MODUL DE
UTILIZARE A DISPOZITIVULUI,
PENTRU A VĂ GHIDA ÎN
PROCESUL DE REABILITARE.

Această fișă de urmărire
vă ajută, de asemenea, să
finalizați protocolul, oferindu-
vă întrebări suplimentare
de adresat în timp ce utilizați
dispozitivul. Acest lucru vă va
ajuta să urmăriți progresul
tratamentului mai precis și
mai eficient.

EVALUARE	Montarea dispozitivului T0	La 3 luni T1	La 6 luni T2
Când observați contracții ale musculaturii labio-mentoniere?			
• când îi cer pacientului să înghită?			
• când observați un tipar de înghițire inconștientă (în timpul unei discuții în mod normal, sau când îi oferiți pacientului o activitate care îi captează atenția)?			
Arcadele dentare sunt în ocluzie la înghițire?			
Pacientul tinde să caute contactul între mucoasa bucală și limba? Pacientul își trece limba peste buze?			
Pacientul are buzele crăpate? Are iritații în jurul buzelor?			

EXAMINAREA MASTICAȚIEI/STOMATOLOGIE

EVALUARE	Montarea dispozitivului T0	La 3 luni T1	La 6 luni T2
Pacientul are masticăție unilaterală sau bilaterală?			
Pacientul prezintă o deformare dentară sau scheletică (mușcătură/ocluzia deschisă anterior, mușcătură /ocluzia deschisă posterior, mușcătură/ocluzia încrucișată, mușcătură /ocluzie inversată, DDM etc.)?			
Dacă da, această deformare este ușoară/moderată/semnificativă?	<ul style="list-style-type: none"> • nici una • ușoară • moderată • semnificativă 	<ul style="list-style-type: none"> • nici una • ușoară • moderată • semnificativă 	<ul style="list-style-type: none"> • nici una • ușoară • moderată • semnificativă

ARTICULAREA/VORBIREA

EVALUARE	Montarea dispozitivului T0	La 3 luni T1	La 6 luni T2
Observați o postură joasă a limbii în repaus?			
Observați o interpunere linguală atunci când pacientul vorbește?			



RESPIRAȚIE

EVALUARE	Montarea dispozitivului T0	La 3 luni T1	La 6 luni T2
Pacientul are adesea gura deschisă sau întredeschisă în timpul zilei?			
Respirația sa este zgomotoasă noaptea?			
Pacientul sforăie noaptea?			
Pacientul se trezește cu gura uscată?			
Pacientul salivează noaptea? (pată de umezeală pe pernă)			
Pacientul are cearcane și un ten palid?			
Pacientul transpiră noaptea?			

FIȘĂ DE MONITORIZARE A TRATAMENTULUI CU FROGGYMOUTH

Această fișă de urmărire vă va ajuta să urmăriți progresul tratamentului cu dispozitivul de reabilitare funcțională Froggy Mouth.

Vă recomandăm să efectuați o evaluare în prima ședință când se montează dispozitivul Froggy Mouth și apoi din nou după 3 luni și la 6 luni pentru a monitoriza progresul tratamentului.

Pentru vă asigura o evaluare corectă, este important să completați această fișă de monitorizare cu pacientul și/sau părinții acestora.

Împreună, veți putea urmări progresul tratamentului cu dispozitivul Froggy Mouth și veți reuși să vă apropiați de obiectivele de reabilitare.

COMPORAMENT

EVALUARE	Montarea dispozitivului T0	La 3 luni T1	La 6 luni T2
Când pacientul se trezește, este adesea obosit sau, dimpotrivă, este hiperactiv?			
(pentru un copil sub 10 ani) Pacientul mai uda patul noaptea?			
Pacientul încă nu se poate concentra să fie atent la școală?			
Pacientului îi este greu să-și gestioneze emoțiile?			
Pacientul suferă de infecții ORL frecvente (de exemplu, infecții ale urechii)?			



EXAMINAREA PACIENTULUI CARE POARTĂ FROGGYMOUTH

EVALUARE	PRIMA EVALUARE	A-2AEVALUARE (ÎN TRE 10 ȘI 30 DE ZILE DE LA MONTAREA DISPOZITIVULUI)	A 3A EVALUARE/ EVALUAREA FINALĂ
Pacientul salivează în timp ce poartă dispozitivul ?			
Pacientul își aspiră saliva zgomotos ?	☹		
Pacientul poziționează vârful limbii între brațele dispozitivului respectiv in spațiul de deschidere a gurii?			
Pacientul poartă Froggymouth în fiecare zi ?			
Cum respiră pacientul tău? Oraț, Mixt cu tendință orală, Mixt cu tendință nazală sau nazal.	☹☹	☹☹☹	
În timpul exercițiului de vorbire, vezi limba încercând să treacă bariera dinților? Sau rămâne pe loc pentru a-și putea îndeplini funcția de înghițire?			☹☹☹☹



Acest lucru este complet normal în prima săptămână - perseverează și vei reuși!

Acțiune: Dacă pacientul continuă să saliveze, inspiră zgomotos sau dacă încă mai poziționează vârful limbii în spațiul de deschidere a Froggymouth după 14 zile, recomandați exercițiul de "luptă".



Sfat : folosește o oglindă mică pentru a observa deschiderea nărilor și direcția fluxului de aer.



Acțiune: "Dacă respirația încă nu este nazală după 3 luni (11), exersează exercițiul de miros pentru a-l automatiza!"



Acțiune: "Repetăți exercițiul de vorbire pentru a evalua dacă tratamentul ar trebui să continue sau dacă pacientul este gata să treacă la etapa finală".

